



## 11. ¿Cómo usar el diario de tratamiento?

Desde el principio del tratamiento, se aconseja utilizar el diario de tratamiento incluido en el instructivo para registrar la cantidad de dosis que se emplea cada vez. Esto le permitirá calcular si la cantidad de dosis que queda en el cartucho es suficiente o si tendrá que utilizar otro cartucho para completar la siguiente dosis dependiendo de lo que le haya prescrito su médico.

Anote la fecha de su inyección y el contenido del cartucho. Anote la dosis prescrita en la columna “Dosis administrada” y restar la dosis que se ha inyectado ese día del número en la columna “Contenido del cartucho” para obtener el “Contenido restante del cartucho”. Este número debe registrarse después en la línea siguiente, en la columna “Contenido del cartucho”.

Día	Fecha	Contenido del cartucho	Dosis administrada	Contenido restante del cartucho
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

## 12. Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	FORMA DE ACTUAR
La unidad dosificadora no se acopla completamente en el alojamiento del cartucho.	Hay algún obstáculo entre los dos elementos	Retire el cartucho y compruebe el alojamiento del cartucho para ver si hay algún obstáculo. Si no hay nada, repita cuidadosamente desde el <b>paso 3</b> .
No puedo quitar las burbujas del cartucho.	El alojamiento del cartucho y la unidad dosificadora no están acoplados correctamente.	Quite la aguja del inyector ( <b>paso 9</b> ). Ajuste la unidad dosificadora con el alojamiento del cartucho, asegurándose que está correctamente acoplado. Coloque una nueva aguja en el inyector y repita el <b>paso 4</b> .
	Esta vacío el cartucho	Sustitúyalo por un nuevo cartucho ( <b>paso 10</b> ).
	No se acopló correctamente la aguja al inyector.	Quite la aguja y sustitúyala por una nueva asegurándose que la aguja se enrosca correctamente al inyector. Repita los pasos desde el <b>paso 3</b> .
El regulador de dosificación puede girar sin hacer clic y el botón de inyección gira libremente.	No es un problema.	El sistema está en su modo de reajuste. El botón de inyección y el regulador de dosificación deben presionarse en todo su recorrido hasta el "0" para reiniciar el mecanismo y seleccionar la dosis correcta. Se oirá un clic por cada paso de la ventana de dosificación.
	Está vacío el cartucho	Sustitúyalo por uno nuevo y realizar los pasos desde el <b>paso 3</b> .
El regulador de dosificación no vuelve a "0" durante la inyección.	Está bloqueada la aguja	a) Remueva el inyector de la piel en conjunto con la aguja y extraiga la aguja del inyector como se indica en el <b>punto 9</b> y elimínela de forma segura. <p>b) Lea la ventana de dosificación y anote la cantidad de medicamento que le queda por inyectarse.</p> <p>c) Monte una nueva aguja en el inyector y elimine las burbujas de aire, en caso que haya, completando los pasos desde el 4 y marque la dosis que le falta.</p>
Se pierde parte del medicamento por la aguja cuando se retira de la piel.	No mantuvo la aguja en la piel durante 10 segundos antes de extraerla tal como se indica en el paso 7.	Si esto ocurre, le recomendamos que informe a su médico. Para evitar este problema otra vez, siempre debe esperar 10 segundos después de que presione el botón de inyección antes de retirar la aguja de su piel ( <b>paso 7</b> ).
La aguja se ha dejado colocada en el inyector .	No ha seguido alguna de las instrucciones.	Extraiga la aguja (paso 9). Sustituya el cartucho por uno nuevo y coloque una nueva aguja. Complete los pasos desde el <b>paso 3</b> .
No puede extraer el cartucho del inyector.	Está acoplada la aguja.	Extraiga la aguja del inyector y deséchela adecuadamente ( <b>vea paso 9</b> ). Desacople el porta cartuchos de la unidad dosificadora y extraiga el cartucho ( <b>vea paso 10</b> ).
No está seguro de la cantidad de medicamento que queda en el cartucho y no quiere empezar una inyección y encontrarse que no hay suficiente medicamento.	No anotó las dosis en el diario de tratamiento.	En caso de cualquier duda debe cargar un nuevo cartucho sin usar en el inyector ( <b>paso 3</b> ). Para evitar este problema otra vez debería utilizar el "Diario de Tratamiento" para anotar sus inyecciones diarias ( <b>paso 11</b> ). Consulte con su médico si todavía tiene dudas sobre cómo usar el diario de dosis.
Después de la última inyección queda un poco de líquido en el cartucho.	El cartucho tiene un volumen adicional de medicamento para realizar el control de flujo de medicamento.	No es un problema. Reemplace el cartucho por uno nuevo como se indica en el <b>paso 10</b> .
El botón de ajuste de dosificación no gira con facilidad.	Puede haber polvo o suciedad.	Puede limpiar el inyector sobrepasando la selección de la dosis más alta, limpiando entonces todas las superficies expuestas con un paño limpio y húmedo.

## MAS INFORMACIÓN

### Cuidado del inyector

- No exponga la lapicera al polvo, ni la ensucie.
- Limpie todas las superficies expuestas del inyector con un paño limpio y húmedo. Nunca lo limpie bajo el agua con detergente ni con desinfectantes potentes.
- Maneje la lapicera cuidadosamente. Podría dañarla si se cae o la maneja con rudeza.
- Si la lapicera se rompe o se daña no intente reparar la misma. Contacte con su médico para obtener una nueva.

### Conservación del inyector [cargado con un cartucho]

- Conservar el inyector en las mismas condiciones que lo indicado para el medicamento.
- Tanto el inyector como el cartucho deben protegerse de la luz.
- No utilice cartuchos de medicamento una vez transcurrida la fecha de vencimiento de los mismos o de acuerdo al consejo de su médico.
- Guarde el inyector, los cartuchos y cualquier otro componente fuera del alcance y la vista de los niños.
- Una vez que haya finalizado su tratamiento, guarde el inyector tal como le haya indicado su médico o personal idóneo.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL INYECTOR

- Previo a utilizar el inyector leer detenidamente las instrucciones de uso y verificar la fecha de validez del producto. No utilizar en caso que haya pasado la fecha de validez del Inyector.

- No accionar el inyector sin un cartucho o con un cartucho vacío.
- No accionar el botón de inyección del inyector hasta estar listo para dar una inyección.
- El inyector debe usarse en forma individual únicamente. No se debe compartir.
- Mantenga la precaución de no apuntar la aguja hacia usted o a otras personas mientras manipula el inyector.
- Almacenar siempre el inyector en un sitio seguro, dentro del envase que lo contiene.
- No intentar la reparación del inyector, si presenta alguna anomalía, debe desecharse y ser reemplazado por uno nuevo.
- Nunca seleccionar su dosis ni intentar corregir la misma con la aguja ya inyectada en su piel, ya que puede causar una dosificación incorrecta.
- Cuando se caiga accidentalmente, verificar la integridad del producto y limpiar la superficie del inyector con un paño limpio humedecido con agua y alcohol y secar inmediatamente. No sumergir en agua.
- En caso de rotura por caída se debe desechar y ser reemplazado por uno nuevo.
- Sólo debe ser utilizado con agujas compatibles con dispositivos lapicera.
- Antes de comenzar a utilizar el equipo, asegurarse que la medicación sea la que se pretende administrar.

- No usar y/o modificar el inyector para usos diferentes de la finalidad para el cual fue diseñado. Utilizar solamente con la medicación que ha sido recetada por un médico.
- Mantener el inyector fuera del alcance de los niños.
- No exponer a la luz solar. Conservar a la temperatura indicada por el medicamento del cartucho. No congelar.
- Ante cualquier duda sobre el uso del equipo o una finalidad no prevista del mismo no aclarado en el instructivo, consultar con su médico.
- Antes de utilizar el producto, verificar que se encuentra en buenas condiciones y asegurarse que se encuentran todas las partes.
- Limpiar la superficie del inyector con un paño limpio humedecido con agua y alcohol y secarlo inmediatamente. Realizar la limpieza antes y después de cada uso. No limpiar el equipo con otros productos que no sean los indicados.
- No sumergir en agua u otros líquidos.
- No tocar la aguja ni dejarla destapada.
- Utilizar una nueva aguja estéril para cada aplicación.
- No dejar las agujas en lugares donde alguien pueda tomarlas.

## CONTRAINDICACIONES

Folitime® no debe utilizarse en caso de:
• Hipersensibilidad al principio activo follitropina alfa, a la FSH o a cualquiera de los excipientes.
• Tumores del hipotálamo o de la hipófisis.
• Aumento del tamaño de los ovarios o quistes no relacionados con SOP (Síndrome de ovario poliquístico).
• Hemorragias ginecológicas de etiología desconocida.
• Carcinoma ovárico, uterino o mamario.
Folitime® no debe utilizarse cuando no puede obtenerse una respuesta eficaz en casos de fallo ovárico primario, malformaciones de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo, tumores fibroides del útero incompatibles con el embarazo y fallo testicular primario.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El tratamiento con gonadotropinas requiere una cierta dedicación por parte de todos los profesionales involucrados, y de instalaciones apropiadas para monitoreo y control de las pacientes. El tratamiento con Folitime® debe ser realizado bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de los problemas de fertilidad. Folitime® es una gonadotropina potente capaz de causar reacciones adversas (ver Reacciones Adversas). Las respuestas a Folitime® debe ser monitoreadas mediante ecografías, solas o combinadas, preferentemente, con la determinación regular de los niveles de estradiol sérico. El grado de respuesta en las pacientes puede variar. Tanto en varones como en mujeres, se debe usar la mínima dosis efectiva para lograr el objetivo del tratamiento.

La autoadministración de Folitime® será realizado por pacientes debidamente capacitados por los profesionales para ello.

Los pacientes con porfiria o con historia familiar de porfiria deben controlarse estrechamente durante el tratamiento con Folitime®. El daño a causa de dicha enfermedad o su desarrollo inicial podría requerir la interrupción del tratamiento.

Folitime® contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, está prácticamente “libre de sodio”.

Para el inicio del tratamiento deberá valorarse en mujeres el tipo de infertilidad de la pareja y las posibles existencias de contraindicaciones para el embarazo. Se deberá evaluar la preexistencia de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos, e instaurar el tratamiento específico adecuado. Un incremento del tamaño del ovario es un efecto esperado de la estimulación ovárica controlada. Se observa con mayor frecuencia en mujeres con síndrome del ovario poliquístico y, por lo general, remite sin tratamiento. El cuadro de Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO) es distinto del aumento de tamaño ovárico no complicado. Este síndrome presenta diferentes grados según la gravedad con síntomas tales como aumento ovárico marcado, niveles elevados de esteroides sexuales y un aumento de la permeabilidad vascular que puede dar lugar a acumulación de líquidos en la cavidad pentoneal, pleural o pericárdica.

El SHO puede progresar rápidamente hasta convertirse en un cuadro clínico grave. La mayoría de las veces se produce después de que el tratamiento hormonal se ha suspendido y alcanza su máxima intensidad aproximadamente de 7 a 10 días después del tratamiento. Por lo tanto, debe seguirse a las pacientes durante al menos 2 semanas tras la administración de hCG. En las técnicas de reproducción asistida, la aspiración de todos los folículos, antes de la ovulación, puede reducir la incidencia de hiperestimulación.

El SHO leve o moderado generalmente se resuelve de manera espontánea. Si se produce un SHO grave, se recomienda interrumpir el tratamiento con gonadotropinas, hospitalizar a la paciente e iniciar sin demora el tratamiento adecuado. En el embarazo múltiple hay un mayor riesgo de complicaciones maternas y perina-

tales. Con el uso de Folitime® se eleva la incidencia de embarazos múltiples y del tipo gemelar. Este riesgo puede minimizarse con la monitorización del ovario. Los embarazos múltiples son habituales en los tratamientos con técnicas de reproducción asistida (TRA). Las pacientes sometidas a terapias hormonales y TRA, están expuestas a una mayor probabilidad de embarazo múltiple.

Las mujeres con antecedentes de enfermedad tubárica tienen riesgo de embarazo ectópico. Todavía no está establecido si el tratamiento con gonadotropinas aumenta o no el riesgo de padecer algún tumor en pacientes infértiles.

Las mujeres que presentan antecedentes tromboembólicos, tienen un mayor riesgo de padecer estos problemas cuando se someten a tratamientos con gonadotropinas. En estos casos deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio del tratamiento. Debe considerarse también que el embarazo por sí mismo genera riesgos tromboembólicos. En varones, los niveles elevados de FSH endógena indican fallo testicular primario, lo que impide una respuesta efectiva al tratamiento con FSH/hCG. Se recomienda practicar espermatogramas 4 a 6 meses después de iniciar el tratamiento para evaluar la respuesta.

## INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

La respuesta folicular puede estar aumentada por la interacción por citrato de clomifeno. La dosis de Folitime® puede verse incrementada por la acción concomitante con fármacos agonistas de GnRH para provocar desensibilización hipofisaria. No se han descrito otras interacciones significativas en el tratamiento con Folitime®.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se ha estudiado la relación entre la administración del fármaco y el uso de máquinas.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Efecto adverso	Tipos	Frecuencia
Tratamiento en mujeres	Quistes Ováricos – Reacciones leves en la zona de administración	Muy Frecuentes
	Síndrome de Hiperestimulación Ovárica – Dolor Abdominal – Náuseas – Vómitos – Diarrea – Distensión abdominal	Frecuentes
	Síndrome de Hiperestimulación Ovárica grave	Poco frecuente
	Torsión ovárica – Complicaciones del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica	Raras
	Tromboembolismo – Reacciones alérgicas sistémicas leves (eritema – erupción – Edema facial)	Muy raras
Tratamientos en Varones	Ginecomastia – acné – aumento de peso	Frecuentes

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento ha sido prescrito sólo para su problema de salud actual. No se lo recomienda a otras personas.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

## EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE UTILIZAR MÁQUINAS

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede afectar a la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada. No se han estudiado los efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir un vehículo o operar maquinaria pesada.

Este medicamento puede